Stand Juli / 2026

SCHLOSS APOTHEKE

FACTBOOK
UNIKAT IMPFSTOFFE

Impfsteckbrief für medizinische Fachkreise

gemäß **Epidemiologischem Bulletin** und den aktuellsten Fach-informationen

- **UNIKAT IMPFSTOFFE I: Impfmatrix**

Indikationsbezogene Übersicht verfügbarer Impfstoffe

- **UNIKAT IMPFSTOFFE II: Impfstoffübersicht A-Z**

Praxisrelevante Impfstoff-Details gemäß Fachinformation

Stand Juli/2026

kühlkette.de
Eine Initiative der **SCHLOSS APOTHEKE**

Wichtige Impffragen klären

Was sind UNIKAT IMPFSTOFFE?

Unikat-Impfstoffe sind unser Beitrag für aktiven Verbraucherschutz. Mit unserem Verfahren wird jede einzelne Impfstoffpackung auf ihrem Weg vom Hersteller bis zum Patienten individuell überwacht, sodass der Anwender erstmals nachvollziehen kann, dass genau sein Impfstoff jederzeit korrekt gelagert und transportiert wurde und seine Wirksamkeit erhalten geblieben ist.

Kontakt Robert-Koch-Institut

Robert Koch-Institut
Nordufer 20
13353 Berlin
Telefon: 030 18754 0
Fax: 030 18754 2328

Kontakt Schloss Apotheke

Schloss Apotheke
Astrid Baldauf und Markus Kerckhoff OHG
Ernst-Reuter-Str. 11 b-c
51427 Bergisch Gladbach
Telefon: 0800 4673786
Fax: 0800 4673329
Mail: info@schloss-impfstoffe.de
Geschäftszeiten: 08.00 – 17.00 Uhr

Impfaufklärung und Impfkalender in verschiedenen Sprachen

Hier finden Sie eine Zusammenstellung von Informationsmaterialien zum Impfen in verschiedenen Sprachen.

Kontakt Hersteller

Astro-Pharma GmbH
Allerheiligenplatz 4
A - 1200 Wien
Telefon: +43 (1) 979 9860
Mail: office@astropharma.at
Vertrieb:
Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH
Am Bahnhof 2, 92289 Ursensollen
Telefon: 09628 9237670
Pharmakovigilanz-Telefon (24/7):
0171 4536801
(außerhalb der normalen Geschäftszeiten)
Mail: info@eberth.de

Astra Zeneca GmbH
Friesenweg 26
22763 Hamburg
Telefon: 040 809034100
Produktanfragen: 0800 2288660
Mail: azinfo@astrazeneca.com

BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
Telefon: 06131 9084-0
Fax: 06131 9084-2121
Mail: service@biontech.de
Mail: medinfode@biontech.de

CSL Behring GmbH
Marketing & Verkauf Deutschland
Philipp-Reis Straße 2
65795 Hattersheim
Telefon: 069 30584437
Fax: 069 305 17129
Mail: medwiss@cslbehring.com

Bavarian Nordic GmbH
Fraunhoferstraße 13
82152 Martinsried
Telefon: 089 26200980
Mail: medical.information_eu
@bavariannordic.com

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
Prinzregentenplatz 9
81675 München
Service Telefon: 0800 1223355
Service Fax: 0800 1223366
Mail: produkt.info@gsk.com

Moderna Germany GmbH
Germany Headquarters
Rosenheimer Straße 143 c
81671 München
Telefon: 0800 1009632
Mail: EMEAMedinfo@modernatx.com

MSD Sharp + Dohme GmbH
Levelingstraße 4a
81673 München
Telefon: 0800 673673673
Fax: 0800 673673329
Mail: infocenter@msd.de

Mylan Germany GmbH
(a Viatris Company)
Lütticherstraße 5
53842 Troisdorf
Telefon: 0800 0700800
Fax: 0800 0700801
Mail: medinfo.medinfo@viatris.com
Für Grippeanfragen:
Telefon: 0511 47543400
Fax: 0800 0700840
Mail: grippeimpfstoffe@viatris.com

Pfizer Pharma
Back Office Center
Linkstraße 10
10785 Berlin
Telefon: 030 550055-51000
Fax: 030 550054-10000
Mail: info@pfizer.com

Sanofi Aventis Deutschland GmbH
Industriepark Höchst, Gebäude K 703
65926 Frankfurt am Main
Telefon: 0800 5454010
Fax: 069 30583777
Mail: medinfo.de@sanofi.com

Seqirus GmbH
StephanGeorgeRing 23
81929 München
Telefon: 0800 3601010
Fax: 0800 3601011
Mail: ccc@seqirus.com

UNIKAT IMPFSTOFFE I: Impfmatrix

Indikationsbezogene Übersicht verfügbarer Impfstoffe

Indikation	Impfstoff	Hersteller
Cholera	DUKORAL (1)	Bavarian Nordic
	Vaxchora (1)	Pharmore
Chikungunya-Virus	Ixchiq (1)	CSL Seqirus
	Vimkunya (1)	Bavarian Nordic
Dengue-Fieber	Qdenga (1)	Takeda
DTPa	Infanrix (1)	GSK
DTPa IPV HIB	Infanrix-IPV+Hib (1/10)	GSK
	PENTAVAC (1)	Sanofi Aventis
DTPa IPV HIB HB	Infanrix hexa (1/10/50)	GSK
	Hexyon (1/10/50)	Sanofi Aventis
	Vaxelis (1/10/50)	MSD
FSME	ENCEPUR Kinder(1/10/20)	Bavarian Nordic
	ENCEPUR Erwachsene (1/10/20)	
	FSME IMMUN Kinder (1/10/20)	Pfizer
	FSME IMMUN Erwachsene (1/10/20)	
Gelbfieber	STAMARIL (1/10)	Sanofi Aventis
Herpes Zoster	Shingrix (1/10)	GSK
Hepatitis A	Havrix Kinder (1/10)	GSK
	Havrix Erwachsene (1/10)	
	AVAXIM (1)	Sanofi Aventis
	Vaqta Kinder (1/10)	MSD
	Vaqta Erwachsene (1/10)	
Hepatitis A+B	Twinrix Kinder (1/10)	GSK
	Twinrix Erwachsene (1/10)	
Hepatitis B	Engerix B Kinder (1/10)	GSK
	Engerix B Erwachsene (1/10)	
	Fendrix *(c) (1)	GSK
	HBVAXPRO 5 Kinder (1) HBVAXPRO 10 Erwachsene (1/10) HBVAXPRO 40 *(d) (1)	MSD
	HEPLISAV B (1)	Bavarian Nordic
HPV	Cervarix (1/10)	GSK
	GARDASIL 9 (1/10)	MSD
IPV	IPV Mérieux (1/10)	Sanofi Aventis
Jap. Encephalitis	IXIARO (1)	Bavarian Nordic

Indikation	Impfstoff	Hersteller
Meningokokken ACWY	Menveo (1)	GSK
	MenQuadfi (1/10)	Sanofi Aventis
	Nimenrix (1/10)	Pfizer
Meningokokken B	Bexsero (1/10)	GSK
	Trumenba (1/10)	Pfizer
Meningokokken C	MENJUGATE 10 (1/10)	GSK
	NeisVac-C (1/10)	Pfizer
MMR	Priorix (1/10)	GSK
	M-M-RVaxPro (1/10)	MSD
MMR Varizellen	Priorix-Tetra (1/10)	GSK
	ProQuad (1/10)	MSD
Pneumokokken	Synflorix (10)	GSK
	PNEUMOVAX 23 (1/10)	MSD
	Prevenar 13 (1/10/50)	Pfizer
	Prevenar 20 (1/10/50)	Pfizer
	Vaxneuvance (1/10/50)	MSD
Pocken / Affenpocken	IMVANEX (1)	Bavarian Nordic
Rotaviren	Rotarix (1/10)	GSK
	RotaTeq (1/10)	MSD
Respiratorischer-Synzytial-Virus (RSV)	Abrysvo (1/10)	Pfizer
	Arexvy (1/10)	GSK
	Beyfortus 50mg (1)	Sanofi Aventis
	Beyfortus 100mg (1)	
	Enflonsia (1)	MSD
Td	Td-Immun (1/10)	Astro Pharma
Td IPV	REVAXiS (1/10)	Sanofi Aventis
TdPa	Boostrix (1/10)	GSK
	COVAXiS (1/10)	Sanofi Aventis
TdPa IPV	Boostrix Polio (1/10)	GSK
	REPEVAX (1/10)	Sanofi Aventis
Tollwut	Rabipur (1)	Bavarian Nordic
	Verorab (1)	Sanofi Aventis
Typhus	Typhim Vi (1)	Sanofi Aventis
	Typhoral L (3)	Scandinavian Biopharma
Varizellen	Varilrix (1/10)	GSK
	VARIVAX (1/10)	MSD

Saisonale Impfstoffe: *Wir informieren Sie gerne über den aktuellen Stand sowie die Verfügbarkeit saisonaler Impfstoffe im Rahmen der Influenza- oder Corona-Prophylaxe. Auch für sämtliche weiteren Impffragen steht Ihnen unser Experten-Team gerne zur Verfügung.*

Legende:
**( ) Packungsgröße*
**(c) für Personen, die an einer Niereninsuffizienz leiden*
**(d) für Prädialyse und Dialyse Patienten*

Angabe ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand Juli/2026

UNIKAT IMPSTOFFE II: Impfstoffübersicht A-Z

Praxisrelevante Impfstoff-Details gemäß Fachinformation

Impfstoff / Indikation / Hersteller / Typ	Darreichungsform / Art der Anwendung	Impfalter / Aussehen	Grundimmunisierung Impfabstände	Auffrischimpfung	Aufbewahrung	Stabilität außerhalb der Kühlkette / Haltbarkeit nach Rekonstitution	Stand der Information
Abrysvo RSV-Impfstoff (Respiratorischer Synzytial-Virus) Pfizer / rekombinant, bivalent	Pulver und Lösungsmittel zu Herstellung einer Injektionslösung i.m.	ab 18 J. Schwangere zwischen SSW 24 und 36 Pulver weiß, Lösungsmittel ist eine klare, farblose Flüssigkeit.	1 Impfung	derzeit nicht bekannt	Im Kühlschrank Lagern (2°C-8°C), nicht einfrieren ungeöffnete Durchstechflaschen bleiben 5 T. zwischen 8°C und 30°C stabil	nach Rekonstitution: Haltbar 4 Stunden bei 15 °C bis 30 °C; nicht einfrieren	FI 09/25
Arexvy RSV-Impfstoff (Respiratorischer Synzytial-Virus) GSK / rekombinant, adjuvantiert	Pulver und Suspension zu Herstellung einer Injektionssuspension i.m.	ab 60 J. im Alter 50 bis 59 J. bei erhöhtem Risiko einer RSV-Erkrankung Das Pulver ist weiß. Die Suspension ist eine opaleszente, farblose bis blass bräunliche Flüssigkeit	1 Impfung	Notwendigkeit nicht nachgewiesen	Im Kühlschrank Lagern (2°C-8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen	nach Rekonstitution: Haltbar 4 Stunden bei 2°C-8°C bzw. bei Raumtemperatur von bis zu 25°C	FI 10/2025
AVAXIM Hepatitis A-Impfstoff (inaktiviert, adsorbiert) Sanofi Aventis / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritzei.m., in Ausnahmen s.c.	ab 16 J. trübe, weißliche Susp.	2 Impfungen á 0,5ml: 0; 6 – 12 M., max. 36 M. Erstschutz 14 T. nach 1. Impfung	vermutlicher Schutz nach 2. Impfung: 10 J.	Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln		FI 07/2025
Bexsero Meningokokken B Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritze tief i.m.	ab 2 M. weiße, opaleszente, flüssige Susp.	A: Säugl. 2 – 5 M.: 3 Impfungen, Abstand mind. 1 M. oder 2 Impfungen, Abstand mind. 2 M. B: Säugl. 6 – 11 M.: 2 Impfungen, Abstand mind. 2 M. C: Kinder 12 – 23 M.: 2 Impfungen, Abstand mind. 2 M. D: Kinder 2 – 10 J.: 2 Impfungen, Abstand mind. 1 M. E: Jugendl. ab 11 J. und Erw.: 2 Impfungen, Abstand mind. 1 M.	A: 1 Dosis im Alter von 12 – 15 M., mind. 6 M. Abstand zur Grundimmunisierung B: 1 Dosis im 2. Lj., mind. 2 M. Abstand zur Grundimmunisierung C: 1 Dosis mit 12 – 23 M. Abstand zur Grundimmunisierung D und E: bei Personen mit fortbestehendem Risiko einer Exposition gegenüber Meningokokken-Erkrankungen sollte eine Auffrischimpfung in Betracht gezogen werden	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln		FI 04/2023
Beyfortus **50mg und 100mg** RSV-Impftstoff Sanofi Aventis/ Totimpfstoff	Injektionslösung in einer Fertigspritze i.m.	Neugeborene und Säuglinge Klare bis opaleszente, farblose bis gelbe Lösung	50mg: 1 Impfung bei einem Körpergewicht < 5 kg 100mg: 1 Impfung bei einem Körpergewicht > 5 kg	Kinder, die während ihrer zweiten RSV-Saison weiterhin anfällig sind: Empfohlende Dosis 2 × 100 mg	Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C), nicht einfrieren, nicht schütteln, nicht direkter Hitze aussetzen. Fertigspritze im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.	max. 8 h stabil bei Lagerung zwischen 20°C und 25°C; vor Licht schützen	FI 04/2025
Boostrix **(zur Aufrischung)** TdPa Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritze tief i.m.	ab 4 J. weiße, trübe Susp.	nicht zur Grundimmunisierung zugelassen	1 Impfung alle 10 J. laut STIKO-Empfehlung	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln und auf Raumtemperatur bringen	max. 7 T. stabil bei Lagerung von bis zu 37°C	FI 06/2023
Boostrix Polio **(zur Auffrischung)** TdPa IPV Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritze tief i.m.	ab 3 J. weiße, trübe Susp.	nur zur Auffrischung – nicht zur Grundimmunisierung zugelassen	laut STIKO-Empfehlung	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln und auf Raumtemperatur bringen	max. 8 h stabil bei einer Temperatur bis 21°C	FI 06/2023
Cervarix (Typen 16,18) HPV Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritze i.m.	ab 9 J. weiße, trübe Susp.	A: Alter bei der 1. Impfung: 9 – 14 J., 2 Impfungen 0; 5 – 13 M. nach der 1. Impfung B: Alter bei der 1. Impfung: 15 J. und älter, 3 Impfungen 0; 1; 6 M.	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln	max. 3 T. stabil bei Lagerung zwischen 8°C und 25 °C, max. 1 T. stabil bei Lagerung zwischen 25 °C und 37 °C	FI 10/2021

Abkürzungen: *(s.) siehe, (FI) Fachinformation, (PI) Produktinformation, (i.m.) intramuskulär, (s.c.) subkutan, (voll.) vollendetem, (Lw.) Lebenswoche, (Lm.) Lebensmonat, (Lj.) Lebensjahr, (T.) Tage, (W.) Woche, (M.) Monat, (J.) Jahr, (h) Stunde, (mind.) mindestens, (max.) maximal, (Jugendl.) Jugendliche, (Erw.) Erwachsene*

Angabe ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand Juli/2026

UNIKAT IMPSTOFFE II: Impfstoffübersicht A-Z

Praxisrelevante Impfstoff-Details gemäß Fachinformation

Impfstoff / Indikation / Hersteller / Typ	Darreichungsform / Art der Anwendung	Impfalter / Aussehen	Grundimmunisierung Impfabstände	Auffrischimpfung	Aufbewahrung	Stabilität außerhalb der Kühlkette / Haltbarkeit nach Rekonstitution	Stand der Information
COVAXiS TdPa Impfstoff (zur Auffrischung) Sanofi Aventis / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritze i.m., in Ausnahmen s.c.	ab 4 J. weißlich trübe Susp.	nur zur Auffrischung – nicht zur Grundimmunisierung zugelassen	1 Impfung alle 5 – 10 J.	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln	max. 72 h stabil bei Lagerung bis 25°C	FI 11/2025
DUKORAL Cholera Impfstoff Bavarian Nordic / Totimpfstoff	Susp. und Brausepulver zur Herstellung einer Susp. zum Einnehmen oral	ab 2 J. nach dem Mischen: farblose, leicht opaleszierende Fl.	A: Kinder 2 – 6 J.: 3 Dosen jeweils im Abstand von 1 – 6 W. B: Kinder ab 6 J. und Erw., 2 Dosen jeweils im Abstand von 1 – 6 W.	A: Kinder von 2 – 6 J.: 1 Dosis innerhalb von 6 M. B: Kinder ab 6 J. und Erw., 1 Dosis innerhalb von 2 J.	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren	max. 14 T. stabil bei Lagerung zwischen 8°C und 25 °C, nach Herstellung des Brausegranulats innerhalb von 2 h verwenden	FI 01/2021
ENCEPUR Erwachsene FSME Impfstoff Bavarian Nordic / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritze i.m., in Ausnahmen s.c.	ab 12 J. weißliche, trübe Susp.	A: 3 Impfungen: 0; 14 T. – 3 M. danach; 9 – 12 M. danach B: Schnellimmu.: 3 Impfungen 0; 7; 21 T.	A: 1. Auffrischung: 3 J nach Grundimmunisierung, dann bei Alter 12 – 49 J. alle 5 - 10 J., bei Alter über 49 J. alle 3 J. B: Schnellimmu.: 1. Auffrischung 12 – 18 M. nach Grundimmunisierung, dann bei Alter 12 – 49 J. alle 5 - 10 J., bei Alter über 49 J. alle 3 J.	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln		FI 04/2025
ENCEPUR Kinder FSME Impfstoff Bavarian Nordic / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritze i.m., in Ausnahmen s.c.	ab 1 J. bis einschl. 11 J. weißliche, trübe Susp.	A: 3 Impfungen: 0; 14 T. – 3 M. danach; 9 – 12 M. danach, oder B: Schnellimmu.: 3 Impfungen 0; 7; 21 T.	A: 1. Auffrischung 3 J. nach Grundimmunisierung, dann alle 5 J. B: Schnellimmu.: 1. Auffrischung 12 – 18 M. nach Grundimmunisierung, dann alle 5 J.	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln		FI 06/2025
Engerix-B Erwachsene Hepatitis B Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritze i.m., in Ausnahmen s.c.	ab vollendetem 16. Lj. leicht milchig-weiße Susp.	A: 3 Impfungen: 0; 1; 6 M. oder B: Schnellimmu.: 4 Impfungen 0; 1; 2; 12 M. C: In Ausnahmefällen ab 18 Jahren: 3 Impfungen 0; 7; 21 T. zzgl. 4. Dosis 12 M.	nach aktueller Datenlage bei immunkompetenten Personen nicht notwendig	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Anwendung gut schütteln, vor Licht schützen	max. 3 T. stabil bei Lagerung bis 37°C und max. 7 Tage bis 25°C	FI 03/2024
Enflonsia RSV-Impfstoff (Respiratorischer-Synzytial-Virus) MSD/ monoklonaler Immunglobulin	Injektionslösung in einer Fertigspritze i.m.	Neugeborenen und Säuglinge während ihrer ersten RSV-Saison; klare bis leicht schimmernde, farblose bis leicht gelbliche Lösung	1 Impfung: - bei Geburt (während der RSV-Saison) - vor Beginn der ersten RSV-Saison (falls das Kind außerhalb der Saison geboren wird)	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, nicht schütteln	max. 48h bei 20°C-25°C	FI 06/2026
Engerix-B Kinder Hepatitis B Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritze i.m., in Ausnahmen s.c.	ab Geburt bis vollendetem 16. Lj. leicht milchig-weiße Susp.	A: 3 Impfungen: 0; 1; 6 M. oder B: Schnellimmu. 4 Impfungen: 0; 1; 2; 12 M.	nach aktueller Datenlage bei immunkompetenten Personen nicht notwendig	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Anwendung gut schütteln, vor Licht schützen	max. 3 T. stabil bei Lagerung bis 37°C und max. 7 Tage bis 25°C	FI 03/2024
Fendrix Hepatitis B Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritze i.m	Personen ab vollendetem 15 Lj., die an Niereninsuffizienz leiden trübe, weiße Susp.	4 Impfungen: 0; 1; 2; 6 M.	ratsam, siehe FI	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln		FI 04/2023
FSME-IMMUN Erwachsene FSME Impfstoff Pfizer / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritze i.m., in Ausnahmen s.c.	ab 16 J. weißliche, opaleszente Susp.	A: 3 Impfungen: 0; 1 – 3 M.; dann 5 – 12 M. oder B: Schnellimmu.: 3 Impfungen 0; 14 T.; dann 5 – 12 M.	16 – 60 J.: 1. Auffrischimpfung nach 3 J.; danach alle 5 J. ab 60 J.: alle 3 J.	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln und auf Raumtemperatur bringen		FI 10/2024

Abkürzungen: *(s.) siehe, (FI) Fachinformation, (PI) Produktinformation, (i.m.) intramuskulär, (s.c.) subkutan, (voll.) vollendetem, (Lw.) Lebenswoche, (Lm.) Lebensmonat, (Lj.) Lebensjahr, (T.) Tage, (W.) Woche, (M.) Monat, (J.) Jahr, (h) Stunde, (mind.) mindestens, (max.) maximal, (Jugendl.) Jugendliche, (Erw.) Erwachsene*

Angabe ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand Juli/2026

UNIKAT IMPSTOFFE II: Impfstoffübersicht A-Z

Praxisrelevante Impfstoff-Details gemäß Fachinformation

Impfstoff / Indikation / Hersteller / Typ	Darreichungsform / Art der Anwendung	Impfalter / Aussehen	Grundimmunisierung Impfabstände	Auffrischimpfung	Aufbewahrung	Stabilität außerhalb der Kühlkette / Haltbarkeit nach Rekonstitution	Stand der Information
FSME-IMMUN Kinder FSME Impfstoff Pfizer / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritze i.m., in Ausnahmen s.c.	1 – 15 J. weißliche, opaleszierende Susp.	A: 3 Impfungen: 0; 1 – 3 M.; dann 5 – 12 M. oder B: Schnellimmu.: 3 Impfungen 0; 14 T.; dann 5 – 12 M.	1. Auffrischimpfung nach 3 J.; danach alle 5 J.	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln und auf Raumtemperatur bringen		FI 10/2024
GARDASIL 9 HPV Impfstoff MSD / Totimpfstoff	Injektionssusp. i.m.	ab 9 J. nach dem Schütteln: weiße, trübe Fl.	A: 2 Dosen Schema Alter bei der 1. Impfung 9 – 14 J.: 2 Impfungen 0; 6 – 12 M. B: 3 Dosen Schema Alter wie A oder bei der 1. Impfung 15 J. oder älter: 3 Impfungen 0; 2; 6 M., Impfserie soll innerhalb 1 Jahr abgeschlossen sein	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln	max. 96 h stabil bei Lagerung zwischen 8°C und 40 °C oder 72 h zwischen 0 °C und 2°C	FI 09/2024
Havrix 1440 Hepatitis A Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Injektionssusp. i.m.	ab 16 Jahren Trübe, flüssige Suspension	1 Impfung	1 Impfung vorzugsweise 6 bis 12 Monate nach Grundimmunisierung, jedoch bis zu 5 Jahre nach Grundimmunisierung	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln	max. 3 T. stabil bei Lagerung zwischen 8°C und 25 °C	FI 03/2025
Havrix 720 Kinder Hepatitis A Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Injektionssusp. i.m.	ab 1 Jahr bis einschließlich 15 Jahre, auch für Jugendliche bis zu 18 Jahren Trübe, flüssige Suspension	1 Impfung	1 Impfung vorzugsweise 6 bis 12 Monate nach Grundimmunisierung, jedoch bis zu 5 Jahre nach Grundimmunisierung	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln	max. 3 T. stabil bei Lagerung zwischen 8°C und 25 °C	FI 03/2025
HBVAXPRO 5µg Hepatitis B Impfstoff MSD / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritzei.m., in Ausnahmen s.c.	ab Geburt bis 15 J. leicht trübe, weiße Susp.	A: 3 Impfungen: 0; 1; 6 M. oder B: Schnellimmu.: 4 Impfungen 0; 1; 2; 12 M.	nicht bekannt, Impflinge mit geschwächtem Immunsystem regelmäßige Titerkontrolle, Auffrischung ggf. sobald Antikörpertiter unter 10 IE/l abfällt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln	max. 72 h stabil bei Lagerung zwischen 8°C und 25 °C oder zwischen 0 °C bis 2°C	FI 06/2022
HBVAXPRO 10µg Hepatitis B Impfstoff MSD / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritzei.m., in Ausnahmen s.c.	ab 16 J. leicht trübe, weiße Susp.	A: 3 Impfungen 0; 1; 6 M. oder B: Schnellimmu.: 4 Impfungen 0; 1; 2; 12 M.	nicht bekannt, Impflinge mit geschwächtem Immunsystem regelmäßige Titerkontrolle, Auffrischung ggf. sobald Antikörpertiter unter 10 IE/l abfällt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln	max. 72 h stabil bei Lagerung zwischen 8°C und 25 °C oder zwischen 0°C bis 2°C	FI 06/2022
HBVAXPRO 40µg Hepatitis B MSD / Totimpfstoff	Injektionssusp.i.m., in Ausnahmen s.c.	Erw. Prädialyse- und Dialysepatienten leicht trübe, weiße Susp.	3 Impfungen: 0; 1; 6 M. Nach vermuteter oder bekannter Hepatitis B-Virus Ansteckung (Verletzung durch erregerhaltige Gegenstände): direkte Gabe von Hepatitis B-Immunglobulin innerhalb von 24 h, die 1. Impfung innerhalb von 7 T., abhängig vom Antikörpertiter weitere Imfpungen nach o.a. Schema	sobald Antikörpertiter unter 10 IE/l abfällt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln	max. 72 h stabil bei Lagerung zwischen 8°C und 25 °C oder zwischen 0 °C bis 2°C	FI 06/2022
HEPLISAV B Hepatitis-B-Impfstoff Bavarian Nordic / Totimpfstoff	Injektionsl. in einer Fertigspritze i.m.	Ab 18 J. Klare bis leicht schillernde, farblose bis leicht gelbe Lösung	2 Impfungen 0;1 M.	nicht bekannt. Bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem oder mit chronischem Nierenversagen kann eine Auffrischimpfung erforderlich sein.	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen		FI 03/2025
Hexyon DTPa IPV HIB HB Impfstoff Sanofi Aventis / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritze i.m.	ab 6 W. weißlich trübe Susp.	A: 3 Impfungen (Mindestabstand zwischen den Impfungen: 4 W.) B: 2 Impfungen (Mindestabstand zwischen den Impfungen: 8 W.)	A: sollte erfolgen: 1 Impfung frühestens 6 M. nach der letzten Impfung B: muss erfolgen: 1 Impfung frühestens 6 M. nach der letzten Impfung	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln	max. 72 h stabil bei Lagerung zwischen 8°C und 25 °C	FI 12/2024

Abkürzungen: *(s.) siehe, (FI) Fachinformation, (PI) Produktinformation, (i.m.) intramuskulär, (s.c.) subkutan, (voll.) vollendetem, (Lw.) Lebenswoche, (Lm.) Lebensmonat, (Lj.) Lebensjahr, (T.) Tage, (W.) Woche, (M.) Monat, (J.) Jahr, (h) Stunde, (mind.) mindestens, (max.) maximal, (Jugendl.) Jugendliche, (Erw.) Erwachsene*

Angabe ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand Juli/2026

UNIKAT IMPSTOFFE II: Impfstoffübersicht A-Z

Praxisrelevante Impfstoff-Details gemäß Fachinformation

Impfstoff / Indikation / Hersteller / Typ	Darreichungsform / Art der Anwendung	Impfalter / Aussehen	Grundimmunisierung Impfabstände	Auffrischimpfung	Aufbewahrung	Stabilität außerhalb der Kühlkette / Haltbarkeit nach Rekonstitution	Stand der Information
IMVANEX Pocken- und Affenpocken - Impfstoff Bavarian Nordic / Lebendimpfstoff	Injektionssusp. s.c.	ab 12J. hellgelbe bis blass-weiße, klare bis milchige Susp.	Personen ohne vorherige Impfung gegen Pocken-, Affenpocken oder Vacciniaviren 2 Impfungen im Abstand von mind. 28 T.	nicht bekannt. Immungeschwächte Patienten, die zuvor bereits gegen Pocken geimpft wurden, erhalten zwei Auffrischungsdosen im Abstand von mind. 28 T.	Lagerung:3 Jahre bei –20 °C ± 5 °C; 5 Jahre bei –50 °C ± 10 °C; 9 Jahre bei –80 °C ± 10 °C vor Anwendung auf Raumtemperatur bringen und 30 Sek. sanft schwenken, vor Licht schützen	vor der Anwendung für max. 8 Wochen bei +2°C und 8°C im Dunkeln stabil	FI 10/2025
Infanrix DTPa Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritze i.m.	ab vollendetem 2. Lm. bis vollendetem 6. Lj. weiße, trübe Susp.	Grundimmunisierung, 3 Impfungen 0; 4; 8 W.	1 Impfung im 2. Lj. ab Beginn des vollendeten 11. – 14. Lm.	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln		FI 06/2023
Infanrix hexa DTPa IPV HIB HB Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Pulver und Suspension zur Herstellung einer Injektionssusp. tief i.m.	Säugl. ab 6 W. und Kleinkinder bis 36 M. nach Rekonstitution: trübe, weiße Suspension	A: 3 Impfungen (Mindestabstand zwischen den Impfungen: 1 M.) oder B: 2 Impfungen (Mindestabstand zwischen den Impfungen: 2 M.)	A: 1 Impfung frühestens 6 M. nach der letzten Impfung, vorzugsweise vor Vollendung des 18. Lm. B: 1 Impfung frühestens 6 M. nach der letzten Impfung, vorzugsweise im Alter von 11 – 13 M.	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln	max. 72 h stabil bei Lagerung zwischen 8°C und 25 °C, nach Rekonstitution: max. 8 h bei Raumtemperatur (21°C) stabil	FI 08/2024
Infanrix-IPV + Hib DTPa IPV HIB Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Pulver und Suspension zur Herstellung einer Injektionssusp. tief i.m.	ab vollendetem 2. Lm., aber nicht über 3. Lj. verimpft werden nach Rekonstitution: trübe, weiße Suspension	2 oder 3 Impfungen innerhalb der ersten 6 Lm. mit Abständen von mind. je 4 W.	1 Impfung frühestens 6 M. nach der letzten Impfung, vorzugsweise zwischen dem vollendeten 11. und 13. Lm. (STIKO-Empfehlung im Alter von 11 M.)	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln	nach Rekonstitution: max. 8 h bei 2°C bis 8°C (Kühlschrank) stabil.	FI 06/2023
IPV Mérieux IPV Impfstoff Sanofi Aventis / Totimpfstoff	Injektionssusp. in einer Fertigspritze i.m., in Ausnahmen s.c.	ab vollendetem 2. Lm. Klare, farblose Susp.	3 Impfungen mit mind. 1 M. Abstand	alle 10 J.	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln und auf Raumtemperatur bringen		FI 01/2025
Ixchiq Chikungunya Impfstoff CSL Seqirus / Lebendimpfstoff	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung i.m.	ab 12 J. nach Rekonstitution: klare, farblose bis leicht gelbliche flüssige Lösung	1 Impfung	derzeit nicht bekannt	Im Kühlschrank Lagern (2°C-8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen	nach Rekonstitution 2 h stabil bei 2 °C – 8 °C oder bei Raumtemperatur 15 °C – 25 °C; ungeöffnete Durchstechflasche 24 h stabil, bei 23 °C und 27 °C	FI 09/2025
IXIARO Japanische Encephalitis Impfstoff Bavarian Nordic / Totimpfstoff	Injektionssusp. i.m., in Ausnahmen s.c.	ab 2 M. nach dem Schütteln: weiße, trübe FI.	A: Kinder ab 2 M. < 3 J. 2 Impfungen á 0,25ml - Abstand 4 W. B: Kinder ab 3 J. < 18 J. 2 Impfungen á 0,50ml - Abstand 4 W. C: Erw. 18 - 65 J. 2 Impfungen á 0,50ml - Abstand 4 W. Schnellimmu. 0 ;7 T. D: > 65 J. 2 Impfungen á 0,50ml - Abstand 4 W.	A: innerhalb des 2. J. nach der Grundimmunisierung (12 – 24 M.) B: innerhalb des 2. J. nach Grundimmunisierung (12 – 24 M.) C: innerhalb des 2. J. nach der Grundimmunisierung (12 – 24 M.) D: Immunantwort niedriger, Dauer des Schutzes ungewiss; vor Exposition Auffrischung empfohlen	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln		FI 11/2019
MENJUGATE 10 Meningokokken C Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Injektionssusp. tief i.m.	ab vollendetem 2. Lm. weiß opalisierend	A: bis vollendetem 12. Lm. 2 Impfungen: 0; 2 M. B: ab vollendetem 12. Lm. 1 Impfung	Empfehlung einer Boosterimpfung bei Säugl. nach erfolgter Grundimmunisierung; Notwendigkeit nicht erwiesen	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung vorsichtig schütteln		FI 09/2021
MenQuadfi Meningokokken ACWY Impfstoff Sanofi Aventis / Totimpfstoff	Injektionslösung i.m.	ab 12 M. klare, farblose Lösung	1 Impfung	1 Impfung kann als Auffrischung verarbeicht werden, zur Notwendigkeit und zum Zeitpunkt liegen keine Daten vor	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren	max. 72 h stabil bei Lagerung zwischen 8°C und 25 °C	FI 07/2025

Abkürzungen: *(s.) siehe, (FI) Fachinformation, (PI) Produktinformation, (i.m.) intramuskulär, (s.c.) subkutan, (voll.) vollendetem, (Lw.) Lebenswoche, (Lm.) Lebensmonat, (Lj.) Lebensjahr, (T.) Tage, (W.) Woche, (M.) Monat, (J.) Jahr, (h) Stunde, (mind.) mindestens, (max.) maximal, (Jugendl.) Jugendliche, (Erw.) Erwachsene*

Angabe ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand Juli/2026

UNIKAT IMPSTOFFE II: Impfstoffübersicht A-Z

Praxisrelevante Impfstoff-Details gemäß Fachinformation

Impfstoff / Indikation / Hersteller / Typ	Darreichungsform / Art der Anwendung	Impfalter / Aussehen	Grundimmunisierung Impfabstände	Auffrischimpfung	Aufbewahrung	Stabilität außerhalb der Kühlkette / Haltbarkeit nach Rekonstitution	Stand der Information
Menveo Meningokokken ACWY Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Injektionslösung i.m.	ab 2 - 65 J. Lösung ist eine farblose, klare Flüssigkeit	1 Impfung, 1 M. vor Exposition	derzeit nicht ausreichend bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen	die ungeöffnete Durchstechflasche ist zwischen 8°C und 25 °C bis zu 24 Stunden stabil	FI 09/2025
M-M-RVAXPro MMR Impfstoff MSD / Lebendimpfstoff	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssusp. i.m. oder s.c.	ab 12 M. (unter besonderen Umständen ab 9 M., siehe FI) nach Rekonstitution: klare, gelbe FI.	1 Impfung; eine 2. Impfung kann mit einem Mindestabstand von 4 W. verabreicht werden, um Personen zu schützen, bei denen kein Impfschutz entwickelt wurde	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung vorsichtig schwenken	nach Rekonstitution: max. 8 h bei 2°C bis 8°C stabil	FI 07/2025
NeisVac-C Meningokokken C Impfstoff Pfizer / Totimpfstoff	Suspensionin einer Fertigspritze i.m.	ab 2 M. Leicht trübe, weiße bis weißliche Suspension	A: Säugl. 2 – 4 M. 2 Impfungen Abstand mind. 2 M.; B: ab 4 M. 1 Impfung	A: bei Grundimmunisierung im Alter von 2 – 12 M. 1 Impfung 12. – 13. M., nicht früher als 6 M. nach letzter Impfung B: Grundimmunisierung im Alter nach 12 M. Auffrischung noch nicht nachgewiesen	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln	max. 9 M. bei Raumtemperatur (bis zu 25 °C)	FI 11/2023
Nimenrix Meningokokken ACWY Impfstoff Pfizer / Totimpfstoff	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung i.m.	ab 6 W. nach Rekonstitution: klare, farblose Lösung	A: Säugl. 6W. – <6M. 2 Impfungen, 0;2 M. B: ab 6 M. 1 Impfung	1 Impfung im Alter von 12 M., Abstand zur Grundimmunisierung mindestens 2 M.	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln; ungeöffnete Durchstechflasche: bei Temperaturen von 0 °C bis 2 °C oder von 8 °C bis 25 °C 72 Stunden lang stabil	nach Rekonstitution: max. 8 h bei max. 30 °C stabil	FI 10/2024
PENTAVAC DTPa IPV HIB Impfstoff Sanofi Aventis / Totimpfstoff	Pulver und Suspension zur Herstellung einer Injektionssuspension i.m.	ab 2 M. nach Rekonstitution: weißlich trübe Susp.	3 Impfungen: im Abstand von jeweils 4 – 8 W. Entsprechend den offiziellen Impfempfehlungen sollte ab einem Alter von 5 J. ein Impfstoff mit reduziertem Diphtherie- toxoid-Gehalt verwendet werden.	1 Impfung im 2 Lj., 6 – 12 M. nach der letzten Impfung der Grundimmunisierung	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung vorsichtig schütteln	nach Rekonstitution: sofort verwenden	FI 01/2025
PNEUMOVAX 23 Pneumokokken Impfstoff MSD / Totimpfstoff	Injektionsslösung in einer Fertigspritze i.m. oder s.c.	ab vollendetem 2. Lj. Klare, farblose Fl.	1 Impfung	entsprechend der offiziellen Impfempfehlung	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren		FI 03/2025
Prevenar 13 Pneumokokken Impfstoff Pfizer / Totimpfstoff	Injektionssusp. i.m.	ab 6 W. homogene, weiße Susp.	A: 6.W. – 6 M., 3 Impfungen + 1 Boosterimpfung: 0; 1; 2 M., dann 4. Impfung im Alter von 11. – 15. M. oder B: 2 Impfungen + 1 Boosterimpfung: 0; 2 M. dann 3. Impfung im Alter von 11. – 15. M. C: ungeimpfte Säugl. ab 7. – 11. M., 2 Impfungen + 1 Boosterimpfung: 0; 1 M., dann 3. Impfung im 2. Lj. empfohlen D: ungeimpfte Kinder ab 12. – 23. M., 2 Impfungen: 0; 2 M. E: ungeimpfte Kinder ab 2 – 17 J. und Erwachsene 1 Impfung	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Anwendung gut schütteln	max. 4 T. haltbar bei Lagerung bis zu 25 °C	FI 04/2025
Prevenar 20 Pneumokokken Impfstoff Pfizer / Totimpfstoff	Injektionssusp. i.m.	ab 6 W. homogene, weiße Susp.	Impfscheme 4 Dosen (3 Dosen + 1 Boosterdosis): 1. Dosis in der Regel im Alter von 2 M.. danach Mindestabstand 4 W., Boosterdosis im Alter von 11-15 M. ab 18 Jahren: 1 Impfung	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank waagerecht lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen	96 Stunden bei Lagerung zwischen 8 °C bis 25 °C; 72 Stunden bei Lagerung zwischen 0 °C bis 2 °C	FI 10/2025
Priorix MMR Impfstoff GSK / Lebendimpfstoff	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung s.c., auch i.m.	ab 9 M. nach Rekonstitution: pfirsichfarben bis fuchsienrosa	A: 9-12 Monate: 2 Impfungen inn. 3 Monate - Mindestabstand 4 W. B: ab 13 Monate: 1 Impfung - eine zweite Dosis entsprechend den aktuellen Impfempfehlungen	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen.	nach Rekonstitution: max. 8 h bei 2°C bis 8°C stabil	FI 07/2025

Abkürzungen: *(s.) siehe, (FI) Fachinformation, (PI) Produktinformation, (i.m.) intramuskulär, (s.c.) subkutan, (voll.) vollendetem, (Lw.) Lebenswoche, (Lm.) Lebensmonat, (Lj.) Lebensjahr, (T.) Tage, (W.) Woche, (M.) Monat, (J.) Jahr, (h) Stunde, (mind.) mindestens, (max.) maximal, (Jugendl.) Jugendliche, (Erw.) Erwachsene*

Angabe ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand Juli/2026

UNIKAT IMPSTOFFE II: Impfstoffübersicht A-Z

Praxisrelevante Impfstoff-Details gemäß Fachinformation

Impfstoff / Indikation / Hersteller / Typ	Darreichungsform / Art der Anwendung	Impfalter / Aussehen	Grundimmunisierung Impfabstände	Auffrischimpfung	Aufbewahrung	Stabilität außerhalb der Kühlkette / Haltbarkeit nach Rekonstitution	Stand der Information
Priorix-Tetra MMR Varizellen Impfstoff GSK / Lebendimpfstoff	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung i.m. auch s.c.	ab 11 M. (unter besonderen Umständen ab 9 M., siehe FI) nach Rekonstitution: pfirsichfarben bis fuchsienrosa	2 Impfungen: vorzugsweise 0; 6 W. bis zu 3 M., Mindestabstand 4 W.	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen	nach Rekonstitution: max. 24 h bei 2°C bis 8°C stabil	FI 08/2025
ProQuad MMR Varizellen Impfstoff MSD / Lebendimpfstoff	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension i.m. oder s.c.	ab 12 M. (unter besonderen Umständen ab 9 M., siehe FI) nach Rekonstitution: klare, blassgelbe bis hellrosa FI.	2 Impfungen: ab 12 M.: vorzugsweise innerhalb 3 M., Mindestabstand 1 M. 9-12 M: Mindestabstand 3 M.	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen	nach Rekonstitution: max. 30 Minuten bei Lagerung zwischen 20 °C bis 25 °C stabil	FI 09/2025
Qdenga Dengue-Fieber Impfstoff Takeda / Lebendimpfstoff	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung s.c.	ab 4 J. Vor Rekonstitution: weißes bis cremefarbenes, gefriergetrocknetes Pulver; Lösungsmittel klare, farblose FI.	2-Dosen-Impfschema M. 0; 3	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen	nach Rekonstitution innerhalb von 2 h verwenden Aus mikrobiologischer Sicht sollte der Impfstoff nach Rekonstitution sofort verwendet werden, chemisch und physikalisch max. 2 h bei bis zu 32,5°C stabil	FI 07/2025
Rabipur (Tollwut-PCEC-Impfst.) Tollwut Impfstoff Bavarian Nordic / Totimpfstoff	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung i.m.	in jedem Alter nach Rekonstitution: klar bis leicht opaleszent und farblos bis leicht rosafarben	A: Grundimmunisierung, 3 Impfungen: 0; 7; 21 oder 28 T. B: Grundimmunisierung Schnellschema Erw. 18 – 65 J.: 3 Impfungen: 0; 3; 7 T. nach Tollwut-Exposition nicht oder unvollständig geimpfter Personen, Essen-Impfschema: 5 Impfungen: 0; 3; 7; 14; 28 T. Zagreb-Impfschema 4 Impfungen: 0 (2 Dosen); 7; 21 T. nach Tollwut-Exposition vollständig geimpfter Personen, 2 Impfungen: 0; 3 T.	Auffrischimpfungen werden im Allgemeinen alle 2 bis 5 Jahre empfohlen	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen	nach Rekonstitution: sofort verwenden	FI 10/2025
REPEVAX TdPa IPV Impfstoff Sanofi Aventis / Totimpfstoff	Injektionssusp. in Fertigspritze i.m.	ab 3 J. weißlich trübe Susp.	nur zur Auffrischung – nicht zur Grundimmunisierung zugelassen	1 Impfung alle 5-10 J. laut FI	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln	max. 72 h stabil, bei einer Temperatur von bis zu 25 °C	FI 11/2025
REVAXiS Td IPV Impfstoff Sanofi Aventis / Totimpfstoff	Injektionssusp. in Fertigspritzei.m., in Ausnahmen tief s.c.	ab 6 J. trüb weißliche Susp.	nur zur Auffrischung – nicht zur Grundimmunisierung zugelassen	entsprechend der offiziellen Impfempfehlung	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln		FI 01/2025
Rotarix Rotaviren Impfstoff GSK / Lebendimpfstoff	Suspension zum Einnehmen oral	ab 6 - 24 W. klare, farblose FI.	2 Impfungen 0; 1 M.,(Mindestabstand 4 W.) wobei die 2. Impfung vorzugsweise vor der 16. W. verabreicht werden sollte, muss aber bis zur 24. W. abgeschlossen sein	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen	nach Anbruch sofort verabreichen	FI 07/2023
RotaTeq Rotaviren Impfstoff MSD / Lebendimpfstoff	Lösung zum Einnehmen oral	ab 6 - 32 W. Klare, blassgelbe Lösung, eventuell mit rosa Farbstich	3 Impfungen: 0; 1; 2 M., (Mindestabstand 4 W.), wobei erste Impfung zwischen vollendeter 6. und 12. Lw. verabreicht werden soll, 3. Impfung sollte vor Vollendung der 22. Lw. verabreicht sein; falls nötig: 3. Impfung bis zur 32. Lw. möglich	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen	unmittelbar nach Entnahme aus dem Kühlschrank verabreichen	FI 04/2022
Shingrix Herpes Zoster Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Pulver und Suspension zur Herstellung einer Injektionssusp. i.m.	ab 50 J. (unter besonderen Umständen ab 18 J., siehe FI) nach Rekonstitution: opaleszente, farblose bis blass bräunliche FI.	2 Impfungen: 0;2, falls erforderlich bis 6 M. nach der ersten Dosis	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen	nach Rekonstitution: aus mikrobiologischen Gründen max. 6 h bei 2°C bis 8°C (Kühlschrank) stabil, chemisch und physikalisch stabil für 24 h bei 30 °C	FI 10/2025

Abkürzungen: *(s.) siehe, (FI) Fachinformation, (PI) Produktinformation, (i.m.) intramuskulär, (s.c.) subkutan, (voll.) vollendetem, (Lw.) Lebenswoche, (Lm.) Lebensmonat, (Lj.) Lebensjahr, (T.) Tage, (W.) Woche, (M.) Monat, (J.) Jahr, (h) Stunde, (mind.) mindestens, (max.) maximal, (Jugendl.) Jugendliche, (Erw.) Erwachsene*

Angabe ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand Juli/2026

UNIKAT IMPSTOFFE II: Impfstoffübersicht A-Z

Praxisrelevante Impfstoff-Details gemäß Fachinformation

Impfstoff / Indikation / Hersteller / Typ	Darreichungsform / Art der Anwendung	Impfalter / Aussehen	Grundimmunisierung Impfabstände	Auffrischimpfung	Aufbewahrung	Stabilität außerhalb der Kühlkette / Haltbarkeit nach Rekonstitution	Stand der Information
STAMARIL Gelbfieber Impfstoff Sanofi Aventis / Lebendimpfstoff	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssusp. s.c., i.m. möglich	ab 9 M. (unter besonderen Umständen ab 6 M., siehe FI) nach Rekonstitution: beige bis rosa-beige und opaleszente Susp.	ab 9 M. 1 Impfung, mind. 10 T. vor Einreise in Endemiegebiet	mit Expositionsrisiko im Abstand von 10 J. eine Impfung	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln	nach Rekonstitution: sofort verwenden	FI 04/2025
Synflorix Pneumokokken Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Injektionssusp. in Fertigspritze i.m.	ab 6. W. bis zum vollendeten 5. Lj. Trübe, weiße Susp.	A: 6 W. – 6.M.: 3 Impfungen á 0,5ml im Abstand von mind. 1 M. oder 2 Impfungen 0;2 M. B: 7. – 11. M.: 2 Impfungen: 0; 1 M. C: 12. M. – 5. J.: 2 Impfungen 0; 2 M.	A: 1 Impfung mind. 6 M. nach Grundimmunisierung, frühestens im Alter von 9 M. B: 1 Impfung im 2. Lj. im Abstand von mind. 2 M. nach Grundimmunisierung C: -	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln und auf Raumtemperatur bringen	2-Dosen-Behältnis: nach erstem Öffnen sofort verbrauchen oder stabil für 6h bei 2°C - 8°C 4-Dosen-Behältnis: nach dem ersten Öffnen 28 T. stabil bei 2°C - 8°C	FI 09/2021
Td-pur Td Impfstoff Astro-Pharma / Totimpfstoff	Fertigspritze tief i.m., in Ausnahmen s.c.	ab 5 J. weißliche, trübe Susp.	3 Impfungen: 0; 4 – 6 W.; dann 6 – 12 M. nach 2. Impfung	alle 10 J.	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln		FI 11/2016
Trumenba Meningokokken B Impfstoff Pfizer / Totimpfstoff	Injektionssusp. i.m.	ab 10 J. weiße, flüssige Susp.	2 Impfungen: 0; 6 M. oder 3 Impfungen: 0; 1 M. ; dann 3. Dosis mind. 4 M. nach der 2.	ratsam bei Personen mit fortbestehendem Risiko, siehe FI	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, horizontale Lagerung, vor Anwendung gut schütteln		FI 04/2025
Twinrix Erwachsene Hepatitis A und B Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Injektionssusp. in Fertigspritze i.m., in Ausnahmen s.c.	ab vollendetem 16. Lj. leicht milchig-weiße Susp.	3 Impfungen: 0; 1; 6 M. oder Schnellimmu., 4 Impfungen: 0; 7; 21 T.; dann 12 M. nach erster Impfung	Notwendigkeit nicht etabliert (siehe FI), bei erhöhtem Hepatitis-B Risiko regelmäßige Titerkontrolle	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung resuspendieren		FI 04/2023
Twinrix Kinder Hepatitis A und B Impfstoff GSK / Totimpfstoff	Injektionssusp. in Fertigspritze i.m, in Ausnahmen s.c.	ab vollendetem 1. bis vollendetem 16. Lj. leicht milchig-weiße Susp.	3 Impfungen: 0; 1; 6 M.	Notwendigkeit nicht etabliert (siehe FI), bei erhöhtem Hepatitis-B Risiko regelmäßige Titerkontrolle	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung resuspendieren		FI 04/2023
Typhim Vi Typhus Impfstoff Sanofi Aventis/ Totimpfstoff	Injektionslösung in Fertigspritze i.m. oder tief s.c.	ab 2 J. klare, farblose Lösung	1 Impfung mind. 2 W. vor Infektionsrisiko	bei dauerhaften Aufenthalt od. Reise spätestens 3 J. nach der letzten Impfung	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung auf Raumtemperatur bringen		FI 01/2025
Typhoral L Typhus Impfstoff Scandinavian Biopharma/ Totimpfstoff	Magensaftresistente Hartkapseln oral	ab 5 J. Zweifarbige Kapseln (weiß und lachsrot)	3 Impfungen 0; 3; 5 T.	3 J. nach der letzten Impfung empfohlen: 3 Impfungen 0; 3; 5 T.	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), vor Licht schützen		FI 08/2023
VAQTA 50 E/1 ml Hepatitis A Impfstoff MSD / Totimpfstoff	Injektionssuspension i.m.	ab 18 J. weißlich trübe Susp.	1 Impfung	6 – 18 M. nach der ersten Impfung	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Anwendung gut schütteln		FI 09/2025
VAQTA Kinder 25 E/0,5 ml Hepatitis A Impfstoff MSD / Totimpfstoff	Injektionssusp. in Fertigspritze i.m.	ab 12 M. bis 17 J. weißlich trübe Susp.	1 Impfung	6 – 18 M. nach der ersten Impfung	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Anwendung gut schütteln		FI 09/2025

Abkürzungen: *(s.) siehe, (FI) Fachinformation, (PI) Produktinformation, (i.m.) intramuskulär, (s.c.) subkutan, (voll.) vollendetem, (Lw.) Lebenswoche, (Lm.) Lebensmonat, (Lj.) Lebensjahr, (T.) Tage, (W.) Woche, (M.) Monat, (J.) Jahr, (h) Stunde, (mind.) mindestens, (max.) maximal, (Jugendl.) Jugendliche, (Erw.) Erwachsene*

Angabe ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand Juli/2026

UNIKAT IMPSTOFFE II: Impfstoffübersicht A-Z

Praxisrelevante Impfstoff-Details gemäß Fachinformation

Impfstoff / Indikation / Hersteller / Typ	Darreichungsform / Art der Anwendung	Impfalter / Aussehen	Grundimmunisierung Impfabstände	Auffrischimpfung	Aufbewahrung	Stabilität außerhalb der Kühlkette / Haltbarkeit nach Rekonstitution	Stand der Information
Varilrix Varizellen Impfstoff GSK / Lebendimpfstoff	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung s.c. oder i.m.	ab 12 M.; unter bestimmten Umständen ab 9 M. (siehe FI) nach Rekonstitution: klar pfirsisch- bis rosafarbene Susp.	A: 9-11 M. 2 Impfungen im Abstand von mind. 3 M. B: ab 12 M. 2 Impfungen: 0; 6 W. (Mindestabstand 4 W.) C: Personen mit hohem Risiko für schwer verlaufende Varizellen u.U. Wiederholungsimpfung (Abstand mind. 4 W.)	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen	nach Rekonstitution: max. 90 Minuten bei 25 °C oder max. 8 h bei 2°C bis 8°C (Kühlschrank) stabil	FI 08/2025
VARIVAX Varizellen Impfstoff MSD / Lebendimpfstoff	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssusp. i.m. oder s.c.	ab 12 M., in besonderen Fällen ab 9 M. nach Rekonstitution: klare, farblose bis schwach-gelbliche Fl.	A: 9 – 12 M. 2 Impfungen im Abstand von mind. 3 M. B: 12 M. – 12 J. 2 Impfungen im Abstand von mind. 1 M. C: ab 13. J., 2 Impfungen: 0; 4 bis 8 W.	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen	nach Rekonstitution: 30 Minuten bei Lagerung zwischen 20 °C bis 25 °C stabil	FI 10/2025
Vaxchora Cholera Impfstoff Pharmore / Lebendimpfstoff	Brausepulver und Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen oral	ab 2 J. Weißes bis cremefarbenes Puffer-Pulver und weißes bis beigefarbenes Wirkstoff-Pulver	1 Impfung spätestens 10 Tage vor einer potenziellen Exposition	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen	stabil 12h zwischen 8 °C und 25 °C nach Rekonstitution innerhalb von 15 Minuten einnehmen	FI 01/2025
Vaxelis DTaP IPV HIB HB Impfstoff MSD / Totimpfstoff	Injektionssusp. in Fertigspritze i.m.	ab 6 W. gleichmäßig trübe, weiße bis fast weiße Susp.	3 Impfungen (Mindestabstand zwischen den Impfungen 1 M.) oder 2 Impfungen (Mindestabstand zwischen den Impfungen 1 M.)	1 Impfung frühestens 6 M. nach der letzten Impfung	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung vorsichtig schütteln	max. 228 h bei 25 °C stabil	FI 09/2025
Vaxneuvance Pneumokokken - Impfstoff MSD / Totimpfstoff	Injektionssusp. i.m.	ab 6 W. Opaleszierende Susp.	A: Kinder von 6 W. bis < 2 J. 3 Imfungen: (1. Impfung im Alter von 6W., 2. Dosis 8 Wochen später, 3. Dosis zwischen dem 11. und 15. LM. 4 Impfungen: 1. Dosis im Alter von 6 W., 2. und 3. Dosis je im Abstand von 4 bis 8 W. danach und 4. Dosis zwischen dem 11. und 15. LM mindestens 2 M nach 3. Dosis B: ungeimpfte Kinder von 7 M. bis < 12 M . 3 Impfungen, 1. und 2. Dosis im Abstand von 4 W., 3. Dosis im Alter von 12 M. mindestens 2 M. nach 2. Dosis C: ungeimpfte Kinder von 12 M. bis < 2 J. 2 Impfungen (Mindesabstand zwischen den Impfungen 2 M.) D: ungeimpfte / nicht vollständig geimpfte Kinder von 2 J. bis <18 J.: 1 Impfung (bei vorheriger Anwendung eines anderen Pneumokokken-Konjugatimpfstoffes 2 M. Mindestabstand) E: ab 18 J.: 1 Impfung	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen	max. 48h stabil, bei 8 °C bis 25°C	FI 11/2024
Verorab Tollwut Impfstoff Sanofi Aventis / Totimpfstoff	Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension i.m. oder i.d.	in jedem Alter nach Rekonstitution: homogene Suspension	Grundimmunisierung: 3 Impfungen: 0; 7; 21 T. (oder 28 T.) nach Tollwut-Exposition bei nicht geimpften Personen: Essen-Impfschema 5 Impfungen: 0; 3; 7; 14; 28 T. Zagreb-Impfschema 4 Impfungen: 0 (2 Dosen); 7; 21 T. nach Tollwut-Exposition bei geimpften Personen: 2 Impfungen: 0; 3 T.	gemäß den Empfehlungen der WHO	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen	i.m. Verabreichung: direkt verwenden i.d. Verabreichung: physikalisch-chemische Stabilität nach Rekonstitution 6 Stunden bei 25 °C und vor Licht geschützt	FI 09/2025
Vimkunya Chikungunya-Impfstoff Bavarian Nordic / Totimpfstoff	Injektionssuspension i.m.	ab 12 J. vor dem Schütteln eine klare Flüssigkeit mit weißem Niederschlag	1 Impfung	derzeit nicht bekannt	im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C), nicht einfrieren, vor Licht schützen, vor Anwendung gut schütteln	Stabilität der Bestandteile bei 8 °C bis 25 °C für 4 Stunden und bei einer Lagerung bei 0 °C bis 2 °C für mindestens 24 h stabil	FI 02/2025

Abkürzungen: *(s.) siehe, (FI) Fachinformation, (PI) Produktinformation, (i.m.) intramuskulär, (s.c.) subkutan, (voll.) vollendetem, (Lw.) Lebenswoche, (Lm.) Lebensmonat, (Lj.) Lebensjahr, (T.) Tage, (W.) Woche, (M.) Monat, (J.) Jahr, (h) Stunde, (mind.) mindestens, (max.) maximal, (Jugendl.) Jugendliche, (Erw.) Erwachsene*

Angabe ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand Juli/2026

Impfkalender 2026

Impfungen und passive Immunisierungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.
Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.



Quelle: RKI EpidBulletin 2026 Nr. 4

G **Grundimmunisierung**
in bis zu 3 Teilimpfungen (G1 – G3)

A **Auffrischimpfung**

S **Standardimpfung**

N **Nachholimpfzeitraum**
Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

a RSV (monoklonale Antikörper): Zwischen April und September Geborene sollen Nirsevimab im Herbst vor Beginn ihrer 1. RSV-Saison erhalten; Neugeborene jeglichen Gestationsalters, die während der RSV-Saison (meist zwischen Oktober und März) geboren werden, sollen Nirsevimab möglichst rasch nach der Geburt erhalten, idealerweise bei Entlassung aus der Geburtseinrichtung bzw. bei der U2 (3.–10. Lebenstag).

b Rota: Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen.

c TdaPHibIPV/HepB/Pnc: Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.

d TdaPHibIPV/HepB/Pnc: Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate.

e MenB: 3 Dosen im Alter von 2 bis 23 Monaten, ab 24 Monaten besteht die Impfserie aus 2 Dosen

f HPV: Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahren oder bei Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich.

g Td(ap): Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 1-malig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

h MMR: Eine Impfstoffdosis eines MMR-Impfstoffs für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit

i Pnc: Impfung mit PCV20.

j COVID19: Für den Schutz von Personen ohne Grunderkrankung sind (mindestens) 3 Antigen-Kontakte nötig, davon mindestens 1 als Impfung.

k H. zoster: Zwei Impfstoffdosen des adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.

l RSV (Impfung): 1-malige Impfung mit einem proteinbasierten RSV-Impfstoff im Spätsommer/Herbst vor Beginn der RSV-Saison

* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.

kühlkette.de

Eine Initiative der SCHLOSS APOTHEKE

Bestellformular Impfstoffe

0800 . 46 733 29
(Fax gebührenfrei)
impfstoffe@schloss-apotheke-versand.de

Artikel (Impfstoff/Hersteller) +	**Packungsgröße**	**Bestellmenge in Packungen**	**Abrechnung** AM*	PB**	SSB***
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐

+ Service Plus
Bestellen Sie Ihre Impfstoffe nach Verfallsdatum. Impfstoffe werden bei uns getrennt nach unterschiedlichen Verfallsdaten gelagert. Die Lagerbestände und die dazu gehörigen Verfallsdaten Ihres gewünschten Impfstoffes können Sie jederzeit und unverbindlich telefonisch bei uns erfragen: **0800 4673786**

* Arbeits- und Betriebsmedizin hier ankreuzen. Sie erhalten eine Rechnung.
** Privater Praxisbedarf hier ankreuzen. Sie erhalten eine Rechnung.
*** Sprechstundenbedarf hier ankreuzen.
Wichtig: Bitte Rezept übersenden!

Ab einem Mindestbestellwert von 60 Dosen liefern wir frei Haus. Für Lieferungen unter 60 Dosen berechnen wir pro Lieferung eine Versandkostenpauschale von € 15,- .

Lieferadresse

Kundennummer (falls vorhanden): _____

Praxis: _____

Ansprechpartner: _____

Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

Rechnungsadresse (falls abweichend)

Rechnungsempfänger: _____

Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

000101/09/26

Bemerkungen (Bsp. Erreichbarkeit/Urlaub, sonstiges):

_____

_____

_____

_____
Unterschrift des Arztes, Ort, Datum, Praxisstempel

Schloss Apotheke · Astrid Baldauf und Markus Kerckhoff OHG
Ernst-Reuter-Straße 11 b-c · 51427 Bergisch Gladbach · Tel.: 0800 4673786 · info@schloss-impfstoffe.de

SCHLOSS APOTHEKE

SCHLOSS APOTHEKE

Bestellen Sie rund um die Uhr...

... per Telefon: 0800 4673786
... per Fax: 0800 4673329
... per E-Mail: impfstoffe@schloss-apotheke-versand.de
Persönlich erreichen Sie uns:
Mo-Fr von 8-17 Uhr

Die bestellten Impfstoffe werden serialisiert verpackt. Dadurch ist eine Nachverfolgung der Chargen jederzeit möglich.

Die Auslieferung erfolgt in „aktiver Kühlung" durch unseren eigenen Lieferdienst oder ThermoMed GmbH.

Die Abrechnung erfolgt entsprechend den vertraglichen Regelungen unmittelbar zwischen Apotheke und den Kostenträgern.

Unser aktuelles Bestellformular können Sie unter dem angegebenen QR-Code downloaden. Bei Rückfragen melden Sie sich gerne.

Unser qualifiziertes Team ist Ihr Ansprechpartner rund um das Thema Impfstoffbestellung

Gerne beraten wir Sie in allen Fragen zu Ihrer Bestellung. In unseren Kernzeiten telefonisch und außerhalb dieser per E-Mail. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Schloss Apotheke
Astrid Baldauf und Markus Kerckhoff OHG

Ernst-Reuter-Str. 11 b-c
51427 Bergisch Gladbach

Telefon: 0800 4673786
Fax: 0800 4673329

Mail: impfstoffe@schloss-apotheke-versand.de
Geschäftszeiten: 08.00 – 17.00 Uhr

kühlkette.de
Eine Initiative der SCHLOSS APOTHEKE